



# آزمایشگاه رازی

تشخیص طبی، آسیب شناسی و ژنتیک

## راهنمای نمونه گیری

### ▶ تست PCT ◀

دکتر هدی ، دکتر شهباز  
دکتر حبیب زاده، دکتر مصباح  
دکتر عسکری

☎ ۰۱۳-۳۴۰۱

به منظور امکان ارزیابی میزان و کیفیت مخاط دهانه رحم و تعیین توانایی اسپرم برای زنده ماندن و حرکت در این محیط، آزمایش نمونه برداری از مخاط پس از مقاربت انجام می‌شود. این آزمایش یکی از ابتدایی‌ترین مراحل آزمایشات تشخیص ناباروری است. توجه به نکات زیر جهت تهیه نمونه مطلوب و متعاقبا حصول نتیجه صحیح ضروری است.

- ۱ نمونه‌گیری باید در روزهای ۱۲-۱۴ سیکل ماهیانه صورت گیرد. برای تعیین زمان دقیق روز نمونه‌برداری با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۲ پیش از انجام این تست، لازم است با آزمایشگاه در مورد روز نمونه‌گیری هماهنگی‌های لازم را انجام دهید.
- ۳ به مدت ۴۸ ساعت پیش از روز آزمایش باید از نزدیکی خودداری نمایید.
- ۴ در صورتی‌که پزشک شما ساعت خاصی را تعیین نکرده است، حدود ۱۰ ساعت قبل از وقت تعیین شده برای حضور در آزمایشگاه نزدیکی صورت گیرد.
- ۵ از پماد واژینال، مواد لوبریکانت و سایر مواد خارجی دیگر به علت ایجاد تداخل در عملکرد اسپرم‌ها استفاده نکنید.
- ۶ قبل از حضور در آزمایشگاه می‌توانید دوش بگیرید اما استفاده از وان و حمام طولانی مدت مجاز نیست.
- ۷ انجام این آزمایش نیاز به ناشتایی ندارد.

