



آزمایشگاه رازی

تشخیص طبی، آسیب شناسی و ژنتیک

راهنمای نمونه گیری

▶ **تست اسکاچ** ◀
(شناشایی کرمه)

دکتر هدی ، دکتر شهباز
دکتر حبیب زاده، دکتر مصباح
دکتر عسکری



۰۱۳-۳۴۰۱

هدف از انجام این آزمایش شناسایی و تشخیص انگل انتروپیوس ورمیکولاریس(کرمک) بوسیله مشاهده تخمهای انگل زیر میکروسکوپ میباشد. آزمایشگاه جهت انجام این تست در منزل، یک لام و مقداری نوار چسب در اختیار شما قرار می‌دهد. رعایت نکات زیر جهت تهیه نمونه مناسب ضروری است.

۱ این کرم شب‌هنجام در نواحی اطراف مقعد تخمریزی می‌کند، بنابراین نمونه‌گیری باید صبح زود و قبل از رفتن به دستشویی و قبل از شستشو انجام شود.

۲ در کودکان این نمونه توسط فرد دیگری تهیه می‌شود، بزرگسالان می‌توانند به تنهایی آن را تهیه نمایند اما بهتر است فرد دیگری اینکار را انجام دهد.

۳ جهت تهیه نمونه در کودکان، چسب نواری را از روی لام تحویل داده شده جدا کرده و از تماس دست با قسمت چسبناک آن خودداری کنید. کودک را بر روی شکم خوابانده و با استفاده از کمک فرد دیگر چسب را بطور کامل بر روی چینهای مخاطی اطراف مقعد چسبانده و جهت اطمینان از چسبیدن با انگشتان خود به آرامی بر روی پوست فشار دهید. پس از چند ثانیه چسب را به آرامی جدا نمایید و همین عمل را با همان چسب در ۲ تا ۳ ناحیه مختلف تکرار نمایید.

می‌توانید از چسب نواری شفاف معمولی (به اندازه کمی کمتر از طول لام) نیز استفاده کنید.

۴ بدون تماس دست با ناحیه چسبناک، چسب را بر روی لام بچسبانید.

۵ در بزرگسالان، در صورتیکه نمونه به تنهایی تهیه می‌شود، باید مانند زمانی که به دستشویی می‌روید نشسته و نوار چسب را بر روی چینهای مخاطی اطراف مقعد چسبانده و سپس جدا نمایید. این عمل را برای ۲-۳ بار و در نواحی مختلف انجام دهید. سپس چسب را بر روی لام بچسبانید. دقیق داشته باشید که نمونه برداری باید حتماً در صبح و قبل از هرگونه شستشو انجام شود.

۶ پس از چسباندن نوار چسب بر روی لام آن را در داخل پاکت قرار داده و همان روز به آزمایشگاه تحویل دهید.

۷ در صورتیکه نیاز به نمونه برداری در روزهای مختلف باشد (طبق دستور پزشک)، مراحل فوق را برای هر مرتبه انجام داده و هر نمونه را در همان روز نمونه‌گیری به آزمایشگاه تحویل دهید.

۸ این انگل بسیار مسری و واگیردار است، حتماً دستهای خود و فرزندتان را پس از نمونه برداری با آب و صابون بشویید.

